



Intérêt :

Ce prélèvement permet l'étude de tous les paramètres du sperme et l'évaluation de la fertilité

Préconisations avant le prélèvement :

La veille du recueil, **boire au minimum 1,5l à 2l de liquide (eau ou autre boisson).**

Le matin, **boire avant de partir afin de pouvoir uriner juste avant le recueil.**



Pour que votre analyse soit représentative de votre fertilité, le prélèvement doit être effectué par masturbation après une **abstinence sexuelle comprise entre 2 et 7 jours** : avoir au minimum une éjaculation (rapport ou masturbation) dans les 7 jours précédant votre rendez-vous au laboratoire, mais pas d'éjaculation les 2 jours avant le rendez-vous (*48 heures minimum, 7 jours maximum sans éjaculation avant le recueil au laboratoire, Manuel OMS 2010*)

Protocole :


1. Uriner avant le recueil
2. Se laver soigneusement les mains et les ongles avec du savon liquide
3. Se laver au savon liquide le gland (en le décalottant), la verge, les bourses. Rincer à l'eau du robinet
4. Désinfecter le gland avec une compresse stérile imbibée de Dakin, sécher avec la deuxième compresse
5. Eviter dorénavant tout contact entre la verge et les poils pubiens et conserver les mains propres pour la masturbation (pas de salive)
6. Ouvrir le flacon de recueil mis à disposition par le laboratoire et identifié par l'étiquette portant les noms/prénoms/dates de naissance des deux conjoints
7. Recueillir, par masturbation (pas de rapport interrompu, ni préservatif, ni gel lubrifiant), la totalité de l'éjaculat dans le flacon stérile. En cas de perte d'une partie du prélèvement, le mentionner au technicien.
8. Refermer rapidement le flacon, noter l'heure de recueil sur la planche d'étiquettes fournie
9. Laisser le flacon dans la salle de recueil, prévenir le secrétariat, retourner en salle de recueil et attendre le technicien



Ci-dessous une aide en image et en différentes langues.

<p>Aquilab Laboratoire de biologie médicale</p>	<p>جمع المنى Receuil de sperme</p>
<p>الهدف هذا الفحص يمكن من تحليل بارامترات المنى</p> <p>تعليمات للأخذ العينات : أخذ العينة يجب أن يتم بعد الامتناع عن ممارسة الجنس على الحد الأدنى من 3 أيام إلى الحد الأقصى 5 أيام ، وبعد وقف العلاج بالمضادات الحيوية لمدة لا تقل عن 48 ساعة إذا كان المطلوب زراعة المنى. لا يجب استخدام الواقي الذكري. اشرب الماء بكميات كبيرة عشية الاختبار. يوم الاختبار تناول بعد شرب كأسين من الماء ، وانتظر 30 دقيقة وبعد ذلك تناول مرة أخرى من أجل تنظيف القناة وتفريغ المثانة. اغسل اليدين جيدا بالماء والصابون. اغسل العضو بالماء والصابون مع الفرك جيدا و التركيز بصفة خاصة على نهايته مع تجفيفه بمنشفة نظيفة.</p>	
<p>افتح القنينة المعقمة التي أعطاك اياها المختبر وضع الغطاء الى الأعلى. اجمع كل المنى في القنينة المعقمة ، وحاول عدم لمس داخل القنينة (لا يجب أن تفقد أي كمية من العينة و اذا حصل هذا يجب ذكره عند تسجيل الملف). اغلق القنينة جيدا سجل تاريخ وساعة أخذ العينة.</p>  	
<p>توجيهات هامة يجب نقل العينة الى المختبر في أسرع وقت ممكن. يمكن تخزينها في 4 + مئوية على الأقصى 3 ساعات بعد أخذ العينة</p>	

RECUIIL SPTOMI D SPBRMI

<p>1) - Vider la vessie. - Empty your bladder - Vaciar la vejiga</p> 	<p>2) - Laver soigneusement les mains et les ongles avec le savon liquide. - Wash carefully hands and nails with the liquid soap - Lavar cuidadosamente las manos y las uñas con jabón líquido.</p> 
<p>3) - Laver soigneusement le gland et le méat urinaire en décalottant le gland avec un antiseptique et les compresses stériles. - Sécher avec une compresse stérile. - Soulever le couvercle du réceptacle et le poser sur une compresse stérile. - Clean carefully the glans with compresses soaked with antiseptic, dry it with another compresses, lift the lid of the receptacle and put it on a sterile compress - Limpiar cuidadosamente el glande despues de abierto descubriéndolo con las compresas embebidas antiseptico, secarlas con otras compresas, levantar la tapa del receptacle y ponerlo sobre una compresa estéril</p> 	<p>4) - Refermer soigneusement et rapidement le réceptacle, le poser sur la tablette du lavabo. - Prévenir l'aide de laboratoire afin qu'elle vienne récupérer le réceptacle. - Close carefully and quickly the receptacle, put it on the tablet of the washbasin. Inform the laboratory assistant. In that you have finished, so she comes to get back the receptacle. - Cerrar cuidadosamente y rapidamente el receptacle, ponerlo sobre la tableta del lavabo. Prevenir al auxiliar de laboratorio el fin de que venga para recuperar el receptacle</p>  